

EDUCACIÓN SOBRE MEDICAMENTOS ORALES CONTRA EL CÁNCER



PASSION FOR PATIENTS
NCODA.ORG



SELPERCATINIB

Nombre de su medicamento

Nombre genérico — selpercatinib (SEL-per-KA-tih-nib)

Nombre de marca — Retevmo™ (reh-TEV-moh)

Usos comunes

Selpercatinib se usa para tratar el cáncer de pulmón de células no pequeñas (NSCLC) con una variación genética llamada fusión RET.

Selpercatinib se usa para tratar el cáncer de tiroides que tiene una variación genética o fusión en la proteína RET.

Selpercatinib se usa para tratar tumores sólidos que tienen una variación genética llamada fusión RET.

Selpercatinib también se puede usar para otros tratamientos.

Dosis y administración

Es importante tomar selpercatinib según las instrucciones recomendadas para que su tratamiento sea lo más efectivo posible, por lo que aquí hay algunos puntos importantes para recordar.

- ☐ Su dosis puede variar, pero la dosis común de selpercatinib es entre 120 miligramos (120mg) y 160 miligramos (160mg) que se debe tomar por la boca dos veces al día, a la misma hora cada día.
- ☐ La dosis de selpercatinib se basa en varios factores que incluyen su altura y peso, estado de salud en general y diagnóstico.
- ☐ Selpercatinib se puede tomar con o sin comida, pero a la misma hora todos los días.
- ☐ Selpercatinib se debe tragar entero y no triturado, cortado o disuelto. Si no es posible tragar selpercatinib, consulte a su médico o farmacéutico para conocer posibles opciones.
- ☐ Si usted vomita una dosis de selpercatinib, No tome otra dosis. Espere hasta su próxima dosis programada.
- ☐ Si olvida tomar una dosis de selpercatinib, siga estas instrucciones:
 - No tome la dosis olvidada al menos que aún falten más de 6 horas antes de su próxima dosis programada. Simplemente tome su próxima dosis al horario regularmente programado.
 - No tome dos dosis a la misma vez.
 - Asegúrese de anotar si olvida una dosis e informe a su médico sobre cualquier dosis omitida.

Interacciones con medicamentos y alimentos

- ☐ Selpercatinib tiene muchas interacciones con otros medicamentos. Informe a sus proveedores de salud sobre todos sus medicamentos recetados, medicamentos sin receta, vitaminas y productos herbales.
- ☐ La toronja o jugo de toronja podría interactuar con selpercatinib; evite comer o tomarlo durante su tratamiento.

EDUCACIÓN SOBRE MEDICAMENTOS ORALES CONTRA EL CÁNCER



PASSION FOR PATIENTS
NCODA.ORG



SELPERCATINIB

- ☐ Hable con su proveedor de salud o farmacéutico antes de comenzar a tomar nuevos medicamentos o suplementos, o recibir cualquier vacuna.

Almacenamiento y manejo

Maneje selpercatinib con cuidado. Al igual que las quimioterapias administradas por vena, este medicamento puede ser tóxico y la exposición de otras personas a este medicamento debe ser limitada.

- ☐ Guarde selpercatinib a temperatura ambiente (68°F–77°F) en un lugar seco, protegido de la luz.
- ☐ Mantenga selpercatinib lejos del alcance de niños y mascotas.
- ☐ Deje selpercatinib en el envase proporcionado hasta que esté listo para tomarlo.
- ☐ Cuando sea posible, administre selpercatinib usted mismo siguiendo los pasos a continuación. Si un familiar, amigo o cuidador le administra selpercatinib, también tendrá que seguir los siguientes pasos:
 1. Lávese las manos con jabón y agua.
 2. Utilice guantes para evitar tocar el medicamento (no es necesario utilizar guantes si usted mismo se administra el medicamento).
 3. Cuidadosamente transfiera selpercatinib de su empaque original a un envase pequeño de medicina u otro desechable.
 4. Administre el medicamento inmediatamente por la boca con agua.
 5. Quítese los guantes y no los utilice para nada más.
 6. Tire los guantes y el envase pequeño de medicina en la basura.
 7. Lávese las manos con jabón y agua.
- ☐ Si usa un organizador diario o recordatorio para su medicamento, contacte a su equipo de salud antes de usarlo.
 - La persona que llenará el organizador diario o recordatorio debe utilizar guantes (no es necesario utilizar guantes si usted mismo llena el organizador diario o recordatorio).
 - Cuando esté vacío, lave el organizador diario con jabón y agua antes de volver a llenarlo. Asegúrese de lavarse sus manos con jabón y agua luego de llenar el organizador diario o recordatorio, aunque haya utilizado guantes.
- ☐ Si le queda selpercatinib sin utilizar, **no** lo tire en la basura y **no** lo tire por el lavamanos o por el inodoro. Hable con su proveedor de salud o farmacéutico sobre cómo deshechar selpercatinib adecuadamente.
- ☐ Si está viajando, coloque el empaque de su selpercatinib en un bolso plástico sellado. Pregunte a su farmacéutico si debe tomar precauciones de viaje adicionales.

EDUCACIÓN SOBRE MEDICAMENTOS ORALES CONTRA EL CÁNCER



PASSION FOR PATIENTS
NCODA.ORG



SELPERCATINIB

Efectos Secundarios de Selpercatinib

Los efectos secundarios comunes que experimentan aproximadamente un tercio o más de los pacientes que toman selpercatinib se encuentran en el lado izquierdo de esta tabla. Usted **NO NECESARIAMENTE** sentirá estos efectos secundarios. Algunas opciones para manejar los efectos secundarios que sí ocurran, están incluidas en el lado derecho de esta tabla. Estos deben ser dialogados con su proveedor de salud. Si usted siente algún efecto secundario que no puede manejar o que no esté en esta tabla, contacte a su proveedor de salud.

Posible Efecto Secundario	Manejo
Cambios en la función del hígado	La función de su hígado será evaluada periódicamente con una prueba de sangre simple. Contacte a su proveedor de salud si nota alguno de los siguientes cambios: • Coloración amarillenta de la piel o de los ojos • Orina oscura o marrón • Sangrado o moretones inusuales
Cambios en electrolitos y otros valores de laboratorio • Bajo nivel de calcio • Alto nivel de glucosa • Bajo nivel de albúmina	Podrán ocurrir algunos cambios en sus valores de laboratorios, los cuales serán monitoreados a través de una prueba simple de sangre. • Si los cambios son leves, usted no necesariamente sentirá síntomas y usualmente no son una señal de un problema más serio. • Algunos cambios más severos pueden ocurrir, los cuales sí pueden ser una señal de un problema más serio. Notifique a su proveedor de salud si siente alguno de los siguientes: • Dificultad para respirar • Molestias en el pecho • Debilidad o fatiga • Nuevos dolores o molestias • Dolor de cabeza • Mareos • Hinchazón de las piernas o los pies • Orina de color rojo o marrón
Disminución de glóbulos blancos y aumento en el riesgo de infecciones	Sus glóbulos blancos serán monitoreados a través de pruebas simples de sangre. Cuando los glóbulos blancos están bajos, usted tiene un mayor riesgo a desarrollar una infección. Tome las siguientes precauciones para protegerse de una infección: • Lave sus manos a menudo, especialmente antes de comer y después de usar el baño. • Evite las multitudes y las personas con fiebre, influenza, u otra infección. • Báñese regularmente para mantener una buena higiene personal. Contacte a su proveedor de salud si presenta alguna señal o síntoma de una infección, como: • Fiebre (temperatura de más de 100.4F o 38C) • Escalofríos • Dolor o molestia en la garganta • Ardor al orinar • Cansancio inusual • Una herida que se enrojece, que está drenando, o que no sana Consulte con su médico antes de tomar un medicamento para la fiebre o escalofríos.

Continúa en la próxima página

EDUCACIÓN SOBRE MEDICAMENTOS ORALES CONTRA EL CÁNCER



PASSION FOR PATIENTS
NCODA.ORG



SELPERCATINIB

Possible Efecto Secundario	Manejo
Aumento en el nivel de colesterol	Podrían ocurrir cambios en su nivel de colesterol y esto puede ser monitoreado a través de pruebas de sangre simples. Quizás no sienta ningún síntoma con estos cambios. Su equipo de salud estará monitoreando este efecto.
Irritación o llagas en la boca	Practique buen cuidado de su boca. • Enjuague su boca frecuentemente. • Cepille sus dientes con un cepillo suave o con un bastoncillo de algodón después de comer. • Utilice un enjuagador bucal suave, sin alcohol, al menos 4 veces al día (después de comer y a la hora de dormir). Por ejemplo, puede mezclar 1/8 de una cucharadita de sal con 1/4 de una cucharadita de bicarbonato en 8 onzas de agua templada (no caliente). • Si tiene llagas en su boca, evite usar productos de tabaco, alcohol y enjuagadores bucales que contengan alcohol. Llame a su proveedor de salud si siente dolor o si nota llagas en su boca o garganta.
Diarrea (evacuaciones sueltas y/o urgentes)	Monitoree la cantidad de evacuaciones que tiene al día. • Beba 8-10 vasos de agua/ líquidos cada día, a menos que su proveedor de salud le haya indicado limitar su ingesta de líquidos. • Coma comidas pequeñas y frecuentes a lo largo del día en lugar de pocas comidas grandes. • Coma alimentos suaves y bajos en fibra (como bananas, puré de manzana, papas, pollo, arroz y tostadas) • Evite alimentos ricos en fibra, como frutas y vegetales crudos y cereales integrales. • Evite los alimentos que provocan gases, como el brócoli y los frijoles. • Evite los alimentos que contengan lactosa, como el yogur y la leche. • Evite los alimentos picantes, fritos y grasosos. Comuníquese con su médico si ocurre algo de lo siguiente: • La cantidad de evacuaciones sueltas que tiene en un día aumenta por 4 o más. • Se siente mareado o aturdido. Su proveedor de salud le puede recomendar un medicamento de venta libre (sin receta médica llamado loperamida (Imodium®) para ayudar con la diarrea, pero hable con su proveedor de salud antes de comenzar a tomar este medicamento.
Cambios en la función de los riñones	La función de sus riñones (función renal) será evaluada periódicamente a través de una prueba de sangre simple. Contacte a su proveedor de salud si nota alguno de los siguientes cambios: • Disminución de la cantidad de orina • Hinchazón inusual de las piernas y los pies
Aumento de la presión sanguínea	Rutinariamente tómese la presión sanguínea. Escriba su presión sanguínea en un diario y repórtelo a su doctor. Contacte a su proveedor de salud si nota presión alta o si nota alguno de los siguientes síntomas: • Dolor de cabeza • Mareos • Dolor de pecho • Dificultad al respirar • Retención de fluido, aumento de peso, o hinchazón

Continúa en la próxima página

EDUCACIÓN SOBRE MEDICAMENTOS ORALES CONTRA EL CÁNCER



PASSION FOR PATIENTS
NCODA.ORG



SELPERCATINIB

Posible Efecto Secundario	Manejo
Fatiga	Usted podrá sentirse más cansado de lo usual, o tener menos energía. • Manténgase lo más activo o activa posible, pero descanse si lo necesita. • Intente realizar actividades físicas todos los días. • Planifique sus actividades y hágalas en el momento del día en el que siente más energías. • Evite operar maquinaria pesada si siente mucho cansancio.
Retención de fluido o hinchazón	• No se mantenga de pie por períodos largos de tiempo. • Mantenga sus piernas elevadas mientras esté sentado o acostado. • Trate de evitar comidas saladas, ya que estas pueden aumentar la hinchazón. • Evite usar ropa apretada y zapatos apretados. • Tome su peso diariamente. Contacte a su proveedor de salud si nota lo siguiente: • Hinchazón en las manos, pies, o piernas. • Si siente dificultad al respirar. • Aumento de 5 libras o más en una semana.
Disminución en el número de plaquetas y aumento en el riesgo de sangrado	Sus plaquetas deben ser monitoreadas a través de pruebas simples de sangre. Cuando están bajas, puede que presente moretones o que sangre más fácil de lo usual. • Tenga cuidado para evitar moretones, cortaduras, o quemaduras. • Sople su nariz con cuidado y no se rasque la nariz. • Cepille sus dientes con cuidado, con un cepillo suave y mantenga una buena higiene oral. • Cuando se afeite, utilice una rasuradora eléctrica, en vez de navajas. • Utilice una lima de uñas en lugar de un cortaúñas. Llame a su proveedor de salud si usted no para de sangrar. Por ejemplo: • Sangrado por la nariz que dura más de 5 minutos, a pesar de aplicar presión. • Una cortadura que continúa drenando, a pesar de aplicar presión. • Sangrado excesivo de la encía cuando se pasa el hilo dental o se cepilla los dientes. Busque atención médica inmediatamente si presenta dolor de cabeza severo, sangre en la orina o en las heces fecales, si está tosiendo sangre, o si hay sangrado prolongado e incontrolable. Puede que tenga que detener su medicamento antes de un procedimiento médico o dental. Hable con su proveedor de salud o su dentista antes de cualquier procedimiento.

EDUCACIÓN SOBRE MEDICAMENTOS ORALES CONTRA EL CÁNCER



PASSION FOR PATIENTS
NCODA.ORG



SELPERCATINIB

Efectos secundarios severos de selpercatinib

- ☐ Selpercatinib podía causar una condición llamada prolongación de QT o QTc, en la cual el ritmo cardíaco podría causar latidos del corazón rápidos o irregulares. Esta frecuencia acelerada de latidos podría resultar en un desmayo o en convulsiones. En raros casos, esto podría poner en peligro su vida. Comuníquese inmediatamente a su equipo de salud si usted siente mareos, sensación de desmayo o si siente que su corazón late rápido o irregularmente durante su tratamiento con selpercatinib.
- ☐ Usted podría estar a mayor riesgo de sangrado mientras toma selpercatinib. Contacte a su equipo de salud si nota sangrado frecuente por la nariz, sangre en sus heces fecales, sangrado que ocurre espontáneamente sin razón, o sangrado que no para después de aplicar presión por 5 minutos.
- ☐ Las reacciones alérgicas severas son raras, pero podrían ser un efecto severo de selpercatinib. Busque atención médica de inmediato si nota dificultad al respirar, hinchazón de su boca o lengua, o un sarpullido severo en la piel.
- ☐ Selpercatinib podría causar que las cortaduras o heridas sanen más lento de lo normal. Comuníquese a su equipo de salud si usted tiene una herida que no sana bien. También avise su equipo de salud si tiene una cirugía o un procedimiento dental programado, ya que el tratamiento con selpercatinib debe interrumpirse antes del procedimiento o cirugía. Su médico podría volver a comenzar su tratamiento cuando la herida haya sanado.
- ☐ Algunos pacientes que toman selpercatinib han experimentado síndrome de lisis tumoral (TLS) al comenzar su tratamiento. Esta condición sucede cuando muchas células cancerosas mueren rápidamente y su contenido se dispersa en la sangre, causando daño en los riñones y otras partes del cuerpo. Su proveedor de salud le podría recetarle un medicamento o exámenes sanguíneos para monitorear este efecto secundario.

Si usted siente CUALQUIER efecto secundario que no puede manejar, llame a su doctor o centro de salud inmediatamente.

(INFORMACIÓN DE CONTACTO INSTITUCIONAL)

Manejo de fluidos corporales y desechos

Debido a que selpercatinib permanece en su cuerpo por varios días después de tomarlo, el medicamento puede estar presente en su orina, heces, sudor, o vómito. Al comenzar a tomarlo, es importante que siga las instrucciones a continuación todos los días hasta terminar su tratamiento. Esto mantendrá a usted, sus seres queridos y el ambiente lo más seguros posible.

- ☐ Mujeres embarazadas deben evitar tocar cualquier cosa que pueda estar sucia con fluidos corporales del paciente.
- ☐ Inodoros y sistemas sépticos
 - Usted puede utilizar el mismo inodoro, tanque séptico o alcantarillado que utiliza siempre. Si tiene un inodoro de baja presión, cierre la tapa y descárguelo dos veces para asegurar que todos los desechos hayan sido descartados.
 - Si el inodoro o el asiento se ensucia con orina, heces o vómito, limpie las superficies antes de que otra persona lo use.
 - Lávese las manos con jabón y agua después de usar el baño.
- ☐ Si usted necesita una bacinilla para la cama, asegúrese de que su cuidador utilice guantes para asistirle con la limpieza y para enjuagar la bacinilla con jabón y agua todos los días.
- ☐ Si usted no tiene buen control de su vejiga o intestinal, utilice una toalla desechable con cubierta de plástico, un pañal o sábana para absorber cualquier desecho corporal.
- ☐ Lave con jabón y agua la piel que ha sido expuesta a desechos corporales o al medicamento.

EDUCACIÓN SOBRE MEDICAMENTOS ORALES CONTRA EL CÁNCER



PASSION FOR PATIENTS
NCODA.ORG



SELPERCATINIB

- ☐ La ropa, sábanas o ropa de cama sucia con fluidos o desechos corporales del paciente deben ser lavados separados de otra ropa o ropa de cama. Si no tiene lavadora, coloque la ropa en bolsos plásticos hasta que puedan ser lavados.
- ☐ Lávese las manos con jabón y agua después de tocar cualquier ropa, sábanas o ropa de cama que pueda estar sucia con fluidos corporales.

Embarazo, actividad sexual y anticoncepción

- ☐ Las mujeres no deben quedar embarazadas y los hombres no deben embarazar a su pareja mientras toman selpercatinib. Los hombres y las mujeres con potencial y edad fértil deben utilizar anticoncepción efectiva durante el tratamiento y por un mínimo de 1 semana después de la última dosis de selpercatinib.
- ☐ Anticoncepción efectiva puede incluir 1 o más de los siguientes: anticonceptivos orales, métodos de barrera, etc.
- ☐ No amamante mientras toma selpercatinib y por 1 semana después de la última dosis de selpercatinib.
- ☐ Por favor, informe a su proveedor de salud si usted queda embarazada.
- ☐ Es seguro abrazar y dar besos. Es posible que se necesiten precauciones especiales para actividades sexuales mientras usted toma selpercatinib y se le recomienda que pregunte a su proveedor de salud.

Para obtener su medicamento

- ☐ Hable con su proveedor de salud sobre cómo obtener su selpercatinib.

(INFORMACIÓN DE CONTACTO DE LA FARMACIA O FARMACIA ESPECIALIZADA)

Recursos adicionales

Página web del producto: <https://www.retevmo.com>

Información de prescripción del producto: <http://uspl.lilly.com/Retevmo/Retevmo.html?s=pi>

Recursos del producto: <https://www.retevmo.com/?section=savings-support>

Actualizado – Marzo 17, 2023

Instrucciones adicionales

EDUCACIÓN SOBRE MEDICAMENTOS ORALES CONTRA EL CÁNCER



PASSION FOR PATIENTS
NCODA.ORG



SELPERCATINIB

Aviso importante: The Association of Community Cancer Centers (ACCC), Hematology/Oncology Pharmacy Association (HOPA), National Community Oncology Dispensing Association, Inc. (NCODA) y Oncology Nursing Society (ONS) han colaborado en la recopilación de información y desarrollo de esta guía educativa para el paciente. Esta guía representa un breve resumen del medicamento derivado de la información proporcionada por el fabricante del medicamento y otros recursos. Esta guía no cubre toda la información existente relacionada con los posibles usos, instrucciones, dosis, precauciones, advertencias, interacciones, efectos adversos o riesgos asociados con este medicamento y no debe sustituir la recomendación de un profesional de la salud. La provisión de esta guía es solo para fines informativos y no constituye ni implica respaldo, recomendación o favorecimiento de este medicamento por parte de ACCC, HOPA, NCODA u ONS, quienes no se responsabilizan y no pueden garantizar la exactitud de la información presentada. Los colaboradores no están haciendo ninguna representación con respecto a los medicamentos, y cada decisión, con respecto a dichos medicamentos, son a riesgo exclusivo de la persona que lo consume. Todas las decisiones relacionadas al consumo de este medicamento deben tomarse con la guía y bajo la dirección de un profesional de la salud calificado. Este recurso educativo ha sido traducido de la versión original en inglés para comodidad del público que no lee inglés, pero debido a los matices en la traducción a un idioma extranjero, pueden existir ligeras diferencias. This education resource has been translated from the original English language version as a convenience to the non-English-reading public but due to the nuances in translating to a foreign language, slight differences may exist.

Permiso: Las hojas de educación sobre quimioterapia oral (OCE) se proporcionan como un recurso educativo gratuito para los pacientes con cáncer que necesitan información concisa y fácil de entender sobre los medicamentos orales contra el cáncer. Los proveedores de atención médica pueden copiar y distribuir las hojas a los pacientes, así como dirigir a los pacientes al sitio web de OCE para obtener información. Sin embargo, la reproducción o reutilización comercial, así como el cambio de marcas o la publicación de cualquier tipo, están estrictamente prohibidos sin el permiso del titular de los derechos de autor. Envíe por correo electrónico las solicitudes de permiso y las consultas sobre licencias a Contact@NCODA.org.

Copyright © 2023 by NCODA. All rights reserved.